



ПОДГОТОВКА К ИРРИГОСКОПИИ

<p>Диета за 2 суток</p>	<p>Нельзя продукты, усиливающие газообразование в кишечнике:</p>	<p>Нужно продукты, уменьшающие газообразование в кишечнике:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • творог, сливочный сыр, сметана, мороженое, йогурт • фрукты, соки • бобовые, грибы, капуста (в т.ч. квашеная) • хлеб и кондитерские изделия, сладости • алкогольные напитки • газированные напитки, в т.ч. квас • мед, заменители сахара (в т.ч. жевательная резинка) 	<ul style="list-style-type: none"> • безлактозное/овсяное/рисовое молоко • куриное яйцо • отварное мясо, каши • арахис, грецкий орех
<p>Препараты</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка включает прием слабительных препаратов или очистительных клизм. • Слабительные препараты: «Фортранс», «Дюфалак», «Эндофальк», «Пикопрел». • Очищение клизмой проводится с вечера перед обследованием и с утра в день процедуры. 	
<p>Очищение</p>	<p>Очищение клизмой проводится с вечера перед обследованием и с утра в день процедуры.</p> <p>Для проведения процедуры используется кружка Эсмарха, наконечник смазывается вазелином.</p>	

<p>Очищение</p>	<p>Вечером ввести в кишечник 1-1,5 л воды комнатной температуры.</p> <p>Повторить процедуру желательно через 1 час.</p> <p>Если очищение проведено правильно, то вода из кишечника будет чистой.</p> <p>С утра ввести в кишечник аналогичное количество жидкости, при необходимости повторить процедуру до прозрачных вод.</p>
<p>Важно</p>	<p>Исследование включает в себя ведение рентгеноконтрастного препарата (тугое наполнение) и воздуха (создание двойного контрастирования) в полый орган (кишечник) с целью изучения анатомических особенностей и оценки функции.</p>
<p>Взять с собой</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Данные предыдущих исследований (диски, заключения) • Выписки, эпикризы, анализы и другая медицинская документация
<p>Явка</p>	<p>За 20 минут до исследования</p>





semeynaya.ru

8 (495) 662-58-85